

Высокоэффективное лечение пролежней с помощью натуральных коллагеновых губок «КОМБУТЕК-2» И «МЕТУРАКОЛ»

Пролежни представляют собой повреждения тканей, которые происходят чаще всего на участках тела, где кожа прилегает к костным выступам. Повреждения могут быть поверхностными, вызванными местным раздражением кожи, и глубокими, когда происходят изменения в подлежащих тканях. Глубокие пролежни часто остаются незамеченными, пока не затронут верхних слоев кожи.

Причина большинства пролежней – давление, особенно на участках тела, где кожа прилегает к костным выступам. При этом нарушается циркуляция крови. Тяжесть поражения зависит от интенсивности и длительности воздействия. Повреждения кожи и маленьких кровеносных сосудов постепенно приводят к гибели клеток. В свою очередь мертвые клетки становятся добычей бактерий и источниками инфекции.

Любой человек, длительное время прикованный к постели или инвалидной коляске, подвергается опасности образования пролежней. Опасность возрастает при большой ограниченности движений и нарушении ощущений. Пролежни чаще образуются на тех участках тела, где больше давление тела или постоянное трение о постельное белье (например, на локтях, коленях, лопатках, спине и ягодицах).

Развитию пролежней способствует плохое питание (уменьшение массы тела, объема

мягких тканей и мышц), отеки, повышенная температура, тучность и другие заболевания.

Ранними признаками поверхностных пролежней является блестящая, покрасневшая кожа на участках тела, испытывающих давление. Позднее на покрасневших участках появляются маленькие волдыри или эрозии, в конечном итоге развивается некроз (гибель клеток тканей), образуются язвы.

Пролежни обычно возникают в местах, которые испытывают большее давление веса тела или трение. Чтобы не допустить образования пролежней, надо часто менять положение больного, прикованного к постели или инвалидной коляске. Его кожу следует регулярно и тщательно осматривать, чтобы не упустить начало этого процесса.

Воспаленная кожа может быть первым признаком глубокого повреждения тканей, оказавшихся под давлением. На участке давления активизируются бактерии, вызывая воспаление, а позднее инфекцию, которая приводит к некрозу. Из язвочек, глубоко проникающих в кожу, могут сочиться дурно пахнущие гнойные выделения.

Советы по уходу

Для предотвращения образования пролежней нужно менять положение больного по крайней мере каждые 2 ч. Не поднимайте высоко изго-

ловье кровати. На короткое время оставляйте колени больного в слегка согнутом положении. Для снятия давления пользуйтесь специальными приспособлениями (например, специальными матрацами и подушечками).

Обеспечьте самый тщательный уход за кожей. Поддерживайте чистоту и сухость кожи, но не пользуйтесь грубым мылом. Чтобы ускорить заживление, легко массируйте кожу вокруг пораженного участка, но не над ним. Втирайте в кожу увлажняющий лосьон. Если больной сильно потеет или страдает недержанием, чаще меняйте белье.

Сделайте все возможное, чтобы больной достаточно ел и пил – тогда он не будет худеть. Это ускорит выздоровление. Если больной истощен, кормите его чаще и маленькими порциями; используйте высококалорийные добавки, содержащие протеины. Слабым больным надо помогать есть.

Как лечат пролежни?

Лечение заключается в эффективном снятии давления на пораженные участки, в поддержании чистоты и сухости кожи; принимаются меры по ускорению заживления пролежней с применением губок «Метуракол» и «Комбутек-2» – это эффективные препараты из натурального коллагена с содержанием лекарственных добавок.

Пролежни представляют собой повреждения тканей, которые происходят чаще всего на участках тела, где кожа прилегает к костным выступам. Повреждения могут быть поверхностными, вызванными местным раздражением кожи, и глубокими, когда происходят изменения в подлежащих тканях.

Для профилактики и лечения пролежней коллагеновую губку «Метуракол» или «Комбутек-2» накладывают на раневую поверхность в виде аппликации так, чтобы он плотно прилегал ко дну и стенкам раны, а края выходили за пределы раны на 1–1,5 см. Поверх препарата накладывают фиксирующую повязку. Предварительно рану следует обработать растворами антисептиков и удалить остатки некротических тканей.

При наличии гнойного отделяемого применение препарата рекомендуется сочетать с растворами антисептика (например диоксидина), смачивая ими препарат. Частота перевязок зависит от глубины и площади раневой поверхности, интенсивности экссудации и наличия некротических масс. Промокшие участки препарата удаляются и заменяются новыми. В среднем перевязку рекомендуется производить 1 раз в 2–3 дня (если нет промокших участков), т.к. за этот срок «Метуракол» полностью лизируется. Если «Метуракол» не рассосался и нет показаний для перевязки (боль, жжение в области раны, скопление гнойного экссудата, наличие аллергических реакций), его не снимают до полного заживления раны грануляционной тканью на всю глубину.

Губку «Метуракол» применяют также в качестве местного средства при комплексном лечении трофических язв, глубоких и длительно незаживающих ран, поверхностных ожогов кожи.

Противопоказания

Применение «Метуракола» противопоказано при наличии в ране избыточных грануляций, а также при индивидуальной непереносимости метилурацила.

Форма выпуска

«Метуракол» выпускают в форме стерильных пластин толщиной 7±3 мм размером 90 мм x 90 мм и 50 мм x 50 мм.

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре. Срок годности 4 года.

«Метуракол» был разработан учеными ММА имени И.М. Сеченова. Клинические испытания проводились на базе Детской городской клинической больницы №9 г. Москвы (тяжелые ожоговые травмы у детей с места катастрофы в Башкирии), Московского медицинского стоматологического института имени М.А. Семашко (гнойные раны), Поликлиники Медицинского Центра Управления делами Президента РФ, Академической группы академика АМН СССР профессора В.И. Стручкова и клинической больницы №23, Всесоюзного научного центра хирургии АМН СССР.



МГНОВЕННАЯ ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЙ

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Уникальные медицинские препараты губки
на основе натурального белка-коллагена



- кровотечения
- пролежни
- ожоги
- трофические язвы
- раневое покрытие
- хирургия
- гинекология
- реанимация
- травматология
- стоматология



ЗАО «ММК «Формед»
 г. Москва, ул. Профсоюзная, 128/2
 Тел./факс: (495) 741-79-09
www.kollagen.ru
 E-mail: arina@kollagen.ru