

Боли в спине? Грыжа межпозвоночных дисков? Можно ли обойтись без хирургического вмешательства? Да! С помощью препаратов серии «Карипаин»!

«Карипаин» – альтернатива операции

Существует два подхода к лечению межпозвоночных грыж – хирургический и консервативный. Оперативное лечение заключается в отсечении того участка грыжи, который сдавливает корешок нерва или сосуд.

Консервативное лечение (лечебная гимнастика, мануальная терапия, традиционная физио- и медикаментозная терапии, грязелечение) уменьшает отек и напряжение окружающих тканей, улучшает кровообращение, за счет этого устраняя болевой синдром, но эффект от обычного лечения кратковременный – до 3 месяцев. Кроме того, эти способы лечения не останавливают прогрессирование дегенеративных изменений в позвоночнике.

Ведущими российскими и зарубежными учеными совместно с фармакологами разработан и успешно применяется новый неоперативный метод лечения межпозвоночной грыжи и других заболеваний позвоночника и суставов препаратами серии «Карипаин». Они содержат протеолитический фермент папаин, получаемый из млечного сока плодов папайи, избирательно действующий на хрящевые ткани позвоночника и суставов, а поэтому весьма эффективный как при хроническом течении указанных заболеваний, так и в начальных их стадиях.

На основе новых методик лечения, успешно применяемых в ведущих отечественных и зарубежных клиниках, были разработаны и внедрены в лечебную практику полиферментные препараты: сухие бальзамы «Карипаин» фл.1 г N10, «Карипаин Плюс» фл. 1 г и крем «Карипаин» туба 50 мл. Все эти препараты предназначены для комплексного лечения и профилактики заболеваний позвоночника и суставов в амбулаторных условиях.

Входящие в их состав активные вещества положительно влияют на хрящевые ткани. При этом, благодаря определенной концентрации папаина и других ферментов, «Карипаин», вводимый методами электрофореза (бальзамы), фонофореза или путем местного применения (бальзамы или крем), влияет на межпозвоночную грыжу. Грыжа под действием ферментов начинает уменьшаться, становится мягкой. Этого достаточно, чтобы освободить нервное окончание и сосуды, которые она защемляет, и боли в позвоночнике проходят.

При грыжах размером более 5 мм «Карипаин Плюс» фл.1г по своему лечебному действию на 15–20% эффективней, чем «Карипаин» фл.1г. Это объясняется наличием в нем дополнительных ферментов – бромелайн и коллагеназа. Эти ферменты оказывают мощное противовоспалительное и противоотечное действие в области локализации грыжи, обеспечивая максимальное воздействие на саму грыжу фермента папаин.

Многочисленные клинические исследования, подтвержденные томограммами МРТ, показывают достоверное уменьшение грыж в среднем на 3–5 мм при прохождении пациентами не менее 2 курсов электрофореза с Карипаином. Рекомендованное число курсов – 3, интервал между курсами 40–50 дней. Для достижения максимального эффекта в короткие сроки пациентам рекомендуется после процедуры электрофореза на ночь втирать в позвоночник Карипаин в форме крема. При противопоказаниях к электрофорезу применяют ультразвуковое введение крема Карипаин.

Хотелось бы еще отметить, что крем «Карипаин» также очень эффективен при заболеваниях суставов. Им успешно лечат артриты, артрозы, остеоартроз, бурсит, контрактуры и другие заболевания суставов. При лечении суставов Карипаин вводят ультразвуком или обычным наружным применением (втиранием в поврежденные суставы) 2 раза в день. В отдельных случаях, при сильных повреждениях суставов используется электрофорез бальзамов Карипаин в комбинации с кремом Карипаин.

Конкретную тактику лечения препаратами серии «Карипаин» выбирает лечащий врач в зависимости от степени поражения позвоночника и суставов, а также индивидуальных особенностей пациента.

Препараты серии «Карипаин» рекомендуется регулярно применять при остеохондрозе, межпозвоночных грыжах, артрите, артрозе, суставных контрактурах и других заболеваниях позвоночника и суставов. Также препараты применяются при келоидных рубцах и спаечных процессах.

Эффективность лечения при остеохондрозе, протрузиях и многих (даже осложненных) грыжах диска превышает 80%. При этом в отличие от операции, лечение «Карипаином» исключает рецидивы.

**Подробная информация и методики применения препаратов серии «Карипаин» изложены на сайтах www.karipain.ru и www.caripain.ru
Группа Компаний «МедВэй»**